

Factsheet

Regionale werkafspraken oxycodon



Samen zorgen we voor veilig en verantwoord gebruik van oxycodon

We willen het risico op verslaving zo klein mogelijk maken.
Daarom hebben we in de regio twee doelen:



Verminderen van het aantal voorschriften
voor snel- en kortwerkende opioïden.



Terugdringen van de duur en frequentie
van het totale oxycodongebruik.



Focus: Patiënten met acute pijn

De meeste winst is te behalen bij het voorkómen van verslaving.

Volg de richtlijnen van het NHG, WHO en het MUMC Basisprotocol voor volwassenen met acute pijn.

Stap 1: Eerste voorschrift



Arts schrijft voor maximaal 14 dagen voor.

- Bij afwijking: vermelding op recept én indien van toepassing in de overdracht naar de huisarts.



Geen herhaalrecept door huisarts indien gestart in de tweede lijn.

- Patiënt wordt terugverwezen naar de voorschrijver in het ziekenhuis.



Apotheek belt met voorschrijver bij recepten langer dan 14 dagen zonder toelichting.



Opmerking op recept door apothek:

- “DIT BETREFT EEN EENMALIGE UITGIFTE”
- Bij kortwerkend gebruik: '0-6 maal daags zo nodig' (niet 1-6 maal daags)

Stap 2: Verder gebruik



Langwerkend oxycodon: **2 tot 3 maal daags**.



Kortwerkend oxycodon: **alleen bij duidelijke indicatie**, zoals voorafgaand aan ADL of verzorging.

- Bij voorschrift 0-6 maal daags zonodig:
 - Voor **7 dagen**: maximaal 20 tabletten.
 - Voor **14 dagen**: maximaal 30 tabletten.



Bij oncologie 'palliatief/oncologie' op het recept vermelden.

Valt verder buiten deze afspraken i.v.m. wel indicatie voor oxycodon